

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕРЫВАНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ ИСКУССТВЕННОГО АБОРТА ПО ДАННЫМ РОДДОМА №1 г. ВИТЕБСКА ЗА 2003 и 2008 гг.

*Лысенко О.В., Никитина А.В., Давыденко Н.Л., Кузнецова Л.В.,
Шедько Т.Б., Хомич Е.К., Бресский А.Г.*

*УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет»*

Введение. Тема искусственного аборта в гинекологической практике остается актуальной до настоящего времени, так как инструментальное прерывание беременности приводит к многим осложнениям. Однозначно аборт приводит к ухудшению репродуктивного здоровья женщин.

Цель исследования. сравнительный анализ рода занятий, места жительства, способов контрацепции, паритета женщин, прерывающих беременность путем искусственного аборта в сроке до 12 недель беременности за 2003 и 2007 гг.

Материалы и методы. нами проанализировано по 103 случайно выбранных истории прерывания беременности женщинам путем искусственного аборта, госпитализированных в 1-ое гинекологическое отделение УЗ «ВГКРД №1» за период с января по сентябрь 2003г. и 2008г. Нами использованы общепринятые методы статистики с использованием компьютерной программы (STATISTICA 6.0).

Результаты и обсуждение. Нами проанализировано по 103 случайно выбранных истории прерывания беременности женщинам путем искусственного аборта за 2003г. и 2008г. Особое внимание обращалось на возраст женщин, перенесенную генитальную и экстрагенитальную патологию, род занятий и образование, способ контрацепции, срок беременности, паритет

Средний возраст женщин составил $27,1 \pm 6,9$ и $26,6 \pm 7,4$ лет соответственно в 2003 и 2008 гг. ($p < 0,01$).

Социальный состав женщин распределился следующим образом (таблица).

Таблица -Социальный состав женщин

Социальный состав	2003 г. (n=103)	2008 г. (n=103)	p
Рабочие со средним специальным образованием	50 (48,5 %)	45 (43,7%)	< 0,01
Отпуск по уходу за ребенком	27 (26,2%)	27 (26,2%)	< 0,01
Не работают	15 (14,6%)	15 (14,6%)	< 0,01
Служащие с высшим образованием	4 (3,9%)	7 (6,8%)	< 0,01
Учащиеся школ	3 (2,9%)	5 (4,6%)	< 0,01
Учащиеся СПТУ	3 (2,9%)	3 (2,9%)	< 0,01
Учащиеся ВУЗов	1(0,9%)	1(0,9%)	< 0,01

Как в 2003, так и в 2008 гг., прослеживается сходная тенденция:

- ведущее место занимают рабочие со средним специальным образованием, что говорит о недостаточном знании методов контрацепции, отсутствии адекватной санитарно-просветительской работы на предприятиях;
- второе место занимают женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, что на наш взгляд, говорит о недостаточной работе кабинетов планирования семьи в женских консультациях;
- третье место – не работающие женщины;
- четвертое – служащие с высшим образованием;
- пятое – учащиеся школ;
- шестое – учащиеся СПТУ;
- седьмое – учащиеся ВУЗов.

В браке на момент прерывания беременности состояло 53 и 54 женщины из 103, что составило 52,4% и 51,5% (в 2003 и в 2008 гг.). Данный факт в контексте с современным отношением к институту брака не позволил нам сделать какие-либо выводы.

Женщин, которым предстояло прерывание первой беременности было по 16 человек в 2003 и в 2008 гг. (15,5% из общего количества пациенток).

Из общего количества женщин, нерожавших было 25 человек (24,3%) в 2003 г. и 30 человек (29,1%) в 2008 г.

При анализе методов контрацепции выявлены одинаковые тенденции: не предохранялось от беременности 75 (72,8%) и 72 женщины (69,9%), в 2003 и 2008 гг. соответственно; использовали презерватив 23 (22,3%) и 26 человек (25,2%), в 2003 и 2008 гг. соответственно; ВМС – 3 (2,9%) в 2008 г.; физиологические методы контрацепции – 5 (4,9%) в 2003г. и 2 (1,9%) в 2008г.

При анализе причин прерывания беременности большинство женщин заявляют, что они не смогли бы себе позволить родить ребенка в связи с низким материальным положением. В подавляющем большинстве случаев аборт заканчиваются нежеланные беременности, наступающие у женщин, которые не используют контрацепцию или пользуются традиционными средствами, имеющими сравнительно высокую частоту неудач

Выводы.

- на протяжении 5 лет сохраняются сходные тенденции:

1. Среди женщин, прерывающих беременность, на первом месте стоят женщины-рабочие со средним специальным образованием, на втором месте – женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, на третьем – неработающий контингент.

2. Подавляющий процент женщин, прерывающих беременность путем искусственного аборта, не используют никаких методов контрацепции для предотвращения нежеланной беременности.

- Необходимо более широко:

1. проводить санитарно-просветительскую работу в школах, СПТУ, ВУЗах, на предприятиях;

2. освещать вопросы контрацепции и вреда искусственного прерывания беременности в средствах массовой информации (телевидение, радиовещание, печатные издания);

3. более продуктивно работать в кабинетах планирования семьи в ЖК с контингентом женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Литература:

1. Айламазян, Э.К. Акушерство / Э.К. Айламазян. – СПб.: «Специальная Литература», 1998. – С. 399 – 408.
2. Кулаков, В.И. Аборт и его осложнения / В.И. Кулаков, И.Р. Зак, Н.Н. Куликова. – М. Медицина, 1987. – 160 с.
3. Полякова, В.А. Современная гинекология / В.А. Полякова. – Тюмень: издательство ФГУИПП «Тюмень», 2004. 1–С. 104 – 217.
4. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – С.158 – 171.